

Для успішного проведення першого туру форсованої планової імунізації інактивованою полівакциною (ІПВ) дитячого населення від 6 місяців до 6 років, які пропустили щеплення згідно Національного календаря щеплень, фахівці ДУ "Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з батьками нещеплених від поліомієліту дітей, включаючи осіб, що належать до ромської національної мешини з метою підвищення рівня обізнаності населення щодо поліомієліту, його наслідків, профілактики та соціальної відповідальності батьків щодо необхідності проведення своєчасних щеплень.

Потужним інструментом для підвищення рівня охоплення щепленнями від поліомієліту є краща обізнаність населення про важливість повноцінної імунізації.

Слід знати – якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це призводить до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.

Варто пам’ятати, що поява поліомієліту будь де є загрозою для всіх дітей в світі.

Противірусних препаратів для специфічного лікування захворювання не існує, проводиться симптоматична терапія.

Єдиним ефективним методом профілактики цього небезпечного захворювання є щеплення.

Згідно державного календаря імунізації, щеплення від поліомієліту проводиться:

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини, інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

2 щеплення – 4-й місяць, інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

3 щеплення – 6-й місяць, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

4 щеплення – 18-й місяць, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

5 щеплення – 6 років, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

6 щеплення – 14 років, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ).

Безкоштовну вакцинацію проти поліомієліту проводить ваш сімейний лікар чи лікар-педіатр, з яким ви підписали декларацію.

Закликаємо батьків вчасно вакцинувати дітей від поліомієліту і надолужити пропущені щеплення.